

Plantes indigènes problématiques et néophytes invasives



Contenu

Ce document présente les plantes problématiques et les néophytes les plus courantes dans le canton de Fribourg. Les risques, les méthodes de lutte et l'élimination correcte sont décrite de manière succincte pour chacune de ces espèces.

Plantes indigènes problématiques

Chardons des champs (<i>Cirsium arvense</i>).....	3
Rumex à feuilles obtuses (<i>Rumex obtusifolius</i>)	3
Sénéçon jacobée (<i>Senecio jacobaea</i>)	4
Vérâtre blanc (<i>Veratrum album</i>).....	4

Néophytes invasives

Ailante (<i>Ailanthus altissima</i>)	5
Ambrosie (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>).....	5
Berce du Caucase (<i>Heracleum mantegazzianum</i>).....	6
Buddleia / Arbre à papillon (<i>Buddleja davidii</i>).....	6
Bunias d'Orient (<i>Bunias orientalis</i>).....	7
Impatiante glanduleuse / Balsamine de l'Himalaya (<i>Impatiens glandulifera</i>)	7
Laurier-cerise / Laurelle (<i>Prunus laurocerasus</i>).....	8
Renouées asiatiques (<i>Reynoutria japonica</i> aggr.)	8
Robinier / Acacia blanc / Faux-acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>).....	9
Séneçon du Cap (<i>Senecio inaequidens</i>)	9
Solidages nord-américains (<i>Solidago canadensis</i> aggr.).....	10
Souchet comestible (<i>Cyperus esculentus</i>).....	10
Sumac / Vinaigrier (<i>Rhus typhina</i>)	11
Vergereffe annuelle (<i>Erigeron annuus</i>)	11
Vignes vierges à 5 folioles (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>).....	12

Autres

Vergereffe du canada (<i>Conyza canadensis</i>)	12
---	----

Sur le site **Info Flora** se trouvent une description détaillée, ainsi que des photos des différentes espèces.



Source : Service des forêts et de la nature, Info Flora

Chardons des champs (*Cirsium arvense*)

Origine : indigène

Dangers

- Forte concurrence pour les plantes utiles
- Difficile à combattre à cause de son système racinaire profond (rhizomes)

Lutte

- Eliminer les foyers avant la formation des graines

Elimination

Eliminer la plante entière dans les ordures ménagères

Ordonnance

Ordonnance DIAF sur la lutte contre le chardon des champs du 23 avril 2007



50-100 cm H; tige sans épines; feuilles dentées à segments ovales et finement épineux; fleurs en panicule ombelliforme

Rumex à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius*)

Origine : indigène

Dangers

- Compétitif
- Concurrence les autres espèces

Lutte

- Eliminer les foyers avant la formation des graines

Elimination

Eliminer la plante entière dans les ordures ménagères



50-120 cm H; feuilles inférieures largement ovales, jusqu'à 30 cm de long; inflorescence dressée, généralement non ramifiée, souvent rouge

Sénéçon jacobée (*Senecio jacobaea*)

Origine : indigène

Dangers

- Toxique pour de nombreux animaux de pâturage

Lutte

- Arracher -2x/an dès la formation des fleurs

Élimination

Jeter la plante entière à la poubelle



30-100 cm H; feuilles inégalement divisées, glabres ou en toile d'araignée dispersée; fleurs jaunes en panicules ombelliformes

Vérâtre blanc (*Veratrum album*)

Origine : indigène

Dangers

- **Toxique (bétail et humains)**
- Concurrence d'autres espèces

Lutte

- Éliminer avec les racines avant la formation des fleurs

Élimination

Éliminer la plante entière dans les ordures ménagères



60-150 cm H; Feuilles alternes, hélicoïdales, largement ovales à lancéolées, face inférieure duveteuse; fleurs blanches à jaunes, en panicules

Ailante (*Ailanthus altissima*)

Origine : Chine et Corée

(introduite comme plante ornementale)

Dangers

- **Se propage surtout dans les zones urbaines et périurbaines**
- Difficile à contrôler : cause des dégâts aux constructions et évince la flore indigène

Lutte

- **Jeunes plantes (< 40 cm) : arracher avec la racine**
- **Arbustes (0.4-2 m) : faucher les pousses et arracher le rhizome**
- Arbres (> 2 m) : cercler

Elimination

Eliminer les fleurs et les fruits avec les ordures ménagères



25 m H; Feuilles opposée imparipennées, j. 12 paires de folioles dentées, écorce avec lenticelle

Ambrosie (*Ambrosia artemisiifolia*)

Origine : Amérique du Nord

(introduite avec des graines de tournesol et des mélanges de graines pour oiseaux)

Dangers

- **Allergènes**
- Repoussent d'autres espèces

Lutte

- **Petite population : arracher 2x/an**
- Grande population : faucher 3x/an avant la floraison

Elimination

Eliminer la plante entière dans les ordures ménagères

Ordonnance

Ordonnance sur la santé des végétaux du 31 octobre 2018 (art. 110, al. 4)



Jusqu'à 25 cm H; Tige très ramifiée dès la base, velue dans la partie supérieure ; feuilles à poils courts et à divisions profondes ; fleurs monoïques en épis

Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*)

Origine : Caucase

(introduit comme plante ornementale et comme plante mellifère)

Dangers

- **Brûlure grave de la peau en combinaison avec l'exposition au soleil (phototoxique)**
- Concurrence la flore indigène

Lutte

- **Faucher 1x/an**
- Couper la racine pour éviter une repousse

Elimination

Eliminer la plante entière dans les ordures ménagères



3-5 m H; feuilles énormes (j. 3m) fortement découpées fleurs blanches en ombelle

Buddleia / Arbre à papillon (*Buddleja davidii*)

Origine : Chine

(Introduite comme plante ornementale)

Dangers

- **Forme des peuplements denses**
- **Concurrence la végétation indigène**
- Impact sur la biodiversité, surtout sur les surfaces pionnières

Lutte

- **Jeunes plantes (< 40cm) : arracher avec les racines**
- Arbustes (> 40 cm) : arracher les racines ou les mettre sur pied

Elimination

Jeter les fleurs et les rhizomes/racines dans les ordures ménagères



3 m H.; feuilles lancéolée opposées, face inférieure duveteuse et grisâtre, fleurs mauves-violettes en cône (comme du lilas)

Bunias d'Orient (*Bunias orientalis*)

Origine : Europe du Sud-Est (Russie, Caucase)

(introduit pour l'agriculture)

Dangers

- **Pénètre durablement dans les prairies, devient dominant et entre en concurrence avec la végétation typique de l'habitat**
- Le bétail l'évite, ce qui diminue la qualité du fourrage

Lutte

- **Petites populations : arracher 1-2x/an**
- Grandes populations : faucher 2x/an avant la floraison

Elimination

Eliminer les fleurs et les racines avec les ordures ménagères



Früchte 30-120 cm H.; feuilles bien divisées, fleurs jaunes en forme de croix (crucifère), fruits verruqueux

Impatiante glanduleuse / Balsamine de l'Himalaya (*Impatiens glandulifera*)

Origine : Himalaya

(introduite comme plante ornementale)

Dangers

- **Forme de grandes populations denses**
- **Le mécanisme de catapulte des fruits accélère la propagation**
- Concurrence la flore indigène

Lutte

- **Petites populations : arracher 3x/an**
- Grandes populations : faucher 5-7x/an avant la floraison

Elimination

Eliminer la plante entière dans les ordures ménagères



Jusqu'à 2,5 m H.; tige creuse rougeâtre, feuilles opposées dentées, fleurs rose-rouge symétriques (comme une gueule de loup)

Laurier-cerise / Laurelle (*Prunus laurocerasus*)

Origine : Turquie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran

(introduite comme plante ornementale)

Dangers

- Forme des peuplements denses, empêche le rajeunissement de la forêt et évince la flore indigène

Lutte

- Jeunes plantes (< 40 cm) : arracher avec la racine
- Arbustes (0.4-2 m) : faucher les pousses et arracher les rhizomes
- Arbres (> 2m) : Cercler

Élimination

Éliminer les fleurs et les fruits avec les ordures ménagères



6m H.; Feuilles persistantes, coriaces, vertes foncées quasi plastifiées, fleurs blanches en capitule

Renouées asiatiques (*Reynoutria japonica* aggr.)

Origine : Japon, Chine et Est de la Russie

(introduite comme plante ornementale et fourragère)

Dangers

- Compétitives, forment des peuplements denses et surplacent la végétation indigène
- Laissent des talus nus en hiver à risque d'érosion

Lutte

- Individus isolés et petits peuplements : arracher 6-7x/an avec les racines
- Grands peuplements : faucher 7x/an

Élimination

Éliminer les rhizomes et les fleurs avec les ordures ménagères



1-3m H.; Tiges creuses, rouges. Forme un zigzag d'une feuille à l'autre, grandes feuilles ovales à pointues, fleurs blanches en grappe

Robinier / Acacia blanc / Faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*)

Origine : Amérique du Nord

(introduit comme arbre ornemental et mellifère et pour la qualité de son bois)

Dangers

- **Forme des peuplements denses**
- **Concurrence la végétation indigène**
- **Réduit la qualité du fourrage**
- Enrichit les sols naturellement pauvres et modifie la composition de l'habitat (diminution de la biodiversité)

Lutte

- **Jeunes plantes (< 40 cm) : arracher avec les racines**
- **Arbustes (0.4-2 m) : faucher les pousses et arracher le rhizome**
- Arbres (> 2 m) : cercler

Élimination

Jeter les inflorescences et les racines à la poubelle, le bois peut être utilisé



20-90 cm H; pousses épineuses, feuilles imparipennées à folioles ovales, fleurs blanches en grappes multiflores

Séneçon du Cap (*Senecio inaequidens*)

Origine : Afrique du Sud

(durch Wollhandel eingeführt)

Dangers

- **Toxique (bétail et humains)**
- menace la flore indigène

Lutte

- Petites populations : arracher 5 fois/an
Grandes populations : faucher 5-7 fois/an avant la floraison

Élimination

Les fleurs sont à éliminer avec les déchets ménagers



40-60 cm H.; Feuilles linéaires indivisées, fleurs jaunes en forme de pâquerette

Solidages nord-américains (*Solidago canadensis* aggr.)

Origine : Amérique du Nord

(introduit comme plante ornementale et comme plante mellifère)

Dangers

- **Forment des populations denses et étendus**
- Concurrence la végétation indigène

Lutte

- **Petites populations : arracher 2x/an**
- Grandes populations : faucher 3x/an avant la floraison

Élimination

Jeter les rhizomes et les têtes florales à la poubelle



Jusqu'à 2m H; feuilles lancéolées et dentées, fleurs jaunes en forme de capitule doré (verge d'or, Goldrute)

Souchet comestible (*Cyperus esculentus*)

Origine : Méditerranée et USA

(introduites en terre et avec des bulbes de plantes ornementales)

Dangers

- **Concurrence les cultures, réduit les récoltes**
- Dissémination via les activités humaines (p. ex. machines agricoles)

Lutte

- **Plantation de céréales ou de maïs (plus grande concurrence)**
- Labour en cas de grande sécheresse, puis ramassage des tubercules secs

Élimination

Éliminer la plante entière dans les ordures ménagères



10-50 cm H.; feuilles comme une herbe, tige triangulaire, fleurs jaunâtres en «brosse tubulaire», racines avec tubercules

Sumac / Vinaigrier (*Rhus typhina*)

Origine : Amérique du Nord

(introduite comme plante ornementale)

Dangers

- **Forme des peuplements denses**
- Menace la flore indigène

Lutte

- **Jeunes plantes (< 40 cm) : arracher avec les racines**
- **Arbustes (0.4-2 m) : faucher les pousses et arracher les rhizomes**
- **Arbres (> 2 m) : cercler**

Élimination

Éliminer les inflorescences et les racines avec les ordures ménagères



Jusqu'à 6m H.; feuilles imparipennées (comme du frêne mais plus grand et velu), inflorescence en cône rouge

Vergerette annuelle (*Erigeron annuus*)

Origine : Amérique du Nord

(introduite comme plante ornementale)

Dangers

- **Très agressive dans sa propagation**
- Concurrence les plantes indigènes

Lutte

- **Petites populations: arracher 3 fois/an**
- **Grandes populations: faucher 5-7 fois/an avant la floraison**

Élimination

Toute la plante est à éliminer avec les déchets ménagers



40-100 cm H; feuilles vert clair dentées, fleurs comme des «pâquerettes sur tige»

Vignes vierges à 5 folioles (*Parthenocissus quinquefolia*)

Origine : Amérique du Nord

(introduite comme plante ornementale)

Dangers

- Pousse sur les arbres et concurrence la végétation sous-jacente grâce à son feuillage dense
- empêche le rajeunissement de la forêt et réduit la diversité végétale

Lutte

- Jeunes plantes (< 40 cm) : arracher avec les racines
- Arbrisseaux (> 40 cm) : couper à la souche et faucher les rejets

Élimination

Éliminer la plante entière avec les ordures ménagères



Jusqu'à 10m H.; feuilles en 5 folioles séparées, fleurs discrètes, fruits bleus. Le feuillage rougit en septembre-octobre

Vergereette du canada (*Conyza canadensis*)

Origine : Amérique du Nord

(introduite comme plante ornementale)

Dangers

- Très agressive dans sa propagation
- provoque des problèmes digestifs chez les animaux de pâturage lorsqu'ils sont consommés en grandes quantités
- Réduit la qualité du fourrage

Lutte

- Petites populations: arracher 3 fois/an
- Grands populations : faucher très bas 5-7x/an avant la floraison

Élimination

Jeter la plante entière aux ordures ménagères



20-80 cm H. feuilles entières ou dentées ; fleurs blanc jaunâtre, en forme de colonne, étroites, glabres ou peu poilues